

**Anbaugbietsprüfung Biogas (AGB), Sortiment B2 (S 230 bis 270)
Nord (nordwest - maritim)
mehrjährig, 2016 bis 2018**

Sorte	Status	Reife- zahl	GM Ertrag dt/ha	GTM Ertrag dt/ha	GTM Ertrag rel.	TS Gespfl. %	BGA IN kg ⁻¹ oTM	BGA rel.	BGE m ³ N ha ⁻¹ oTM	BGE rel.	Lager fr. Stängelbr. %	Sommer- lager %	Sommer- lager (1-9)	Lager v. Reife %	Pflz.- länge cm
Mittel (VR)			602,8	210,6	100,0	35,2	710	100,0	13961	100,0	0,0	2,2	1,0	2,3	318
GD5%			26,8	8,3	3,9	1,1	13,0	1,8	656	4,5					
Mittel (PG)			598,5	215,4	102,3	36,4	726	102,3	14584	104,5	0,5	1,8	1,5	4,2	316
P8589	VR	260	611,0	206,5	98,0	33,8	694	97,7	13361	95,7	0,0	0,0	1,0	1,5	309
Ampatico KWS	VR	270	645,7	218,3	103,6	33,9	705	99,2	14347	102,8	0,0	2,6	1,0	4,4	333
DKC 3560	VR	230	551,6	207,2	98,4	37,8	732	103,1	14176	101,5	0,0	4,0	1,0	1,0	313
Palmer	VG	290	667,1	214,0	101,6	32,2	696	98,0	13922	99,7	0,0	0,0	1,0	1,2	322
Carolinio KWS	VG	230	540,6	203,3	96,5	37,8	734	103,3	13943	99,9	0,2	1,9	1,0	0,6	309
P8666	2	260	634,4	222,8	105,8	35,3	735	103,5	15360	110,0	0,4	3,5	1,0	5,6	304
Agrogant	1	260	621,4	223,6	106,1	36,1	721	101,6	14859	106,4	0,0	0,0	1,0	4,8	318
Bernardino	1	240	572,9	218,0	103,5	38,2	759	106,9	15475	110,8	0,0	2,5	2,0	1,5	314
DKC 3360	1	230	508,3	197,7	93,8	38,9	736	103,6	13614	97,5	0,2	1,3	1,5	3,3	317
ES Joker	1	250	624,1	223,0	105,9	35,9	732	103,1	15133	108,4	3,0	1,4	4,0	15,0	324
KWS Fabiano	1	230	595,8	219,1	104,0	37,1	727	102,4	14981	107,3	0,3	1,9	1,0	3,5	322
Paratico	1	250	558,7	215,6	102,4	39,0	742	104,5	14800	106,0	0,0	0,0	1,0	2,5	300
Stromboli CS	1	270	661,5	217,3	103,2	33,1	680	95,8	13758	98,5	0,6	5,3	1,0	4,4	329
Anzahl Versuche*:			38	38	38	38	36	36	36	36	3	1**	2**	13	29

rel. = relativ im Vergleich zum Mittelwert der Verrechnungssorten (VR absolut) = 100;

(VR) = Verrechnungssorte; Mittel (PG) = Mittelwert der Prüfglieder ohne (VR)

BGA = Potenzielle Biogausbeute in I_N kg⁻¹ oTM

BGE = Potenzieller Biogasertrag in m³_N ha⁻¹

* Anzahl Versuche der Gesamtserie; nicht jede Sorte wurde in allen Versuchen geprüft.

** Hinweis: Anzahl Pflanzen mit Sommerlager (%) und Sommerlager Bonitur (1-9) wurden jeweils an unterschiedlichen Standorten erfasst.

